

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Башкирский государственный педагогический
университет им. М.Акумлы

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

АКМУЛЛИНСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПО БИОЛОГИИ

Участник Тимуров Дами Эдуардович

(фамилия имя отчество)

$(875) + 37$
 $= 725$

ФИО наставника Оберютина Елена
Валерьевна

Дата проведения олимпиады
"10" 03 2026 г.

Очный тур Акмуллинской олимпиады по биологии
2025-2026 учебный год

10-11 класс, СПО

Задания очного тура

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

375

Перед Вами задания очного тура. Ответы на задания очного тура необходимо прописать на бланках с заданием.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 52.

Задание 1 (32 балла). Определение сосущей силы клеток растительной ткани по изменению концентрации внешнего раствора.

Материалы и оборудование. Кубики растительной ткани, 1М раствор NaCl, дистиллированная вода, раствор метиленовой сини, препаровальная игла, фильтровальная бумага, пинцет, 7 больших пробирок, 7 маленьких пробирок, штатив для пробирок, пипетки Пастера, мерная пробирка.

Ход работы.

Используя 7 больших пробирок приготовить по 10 мл растворов хлористого натрия в следующих концентрациях: 1,0; 0,8; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3 и 0,2М. После тщательного перемешивания отлить в маленькие пробирки по 1мл приготовленных растворов.

Разложить кубики растительных тканей в маленькие пробирки с растворами. Выдержать их в течение 20-30 минут, время от времени, встряхивая пробирки.

По истечении указанного срока кубики вынимают из пробирок и приступают к определению изменения удельного веса растворов, где до этого пребывали кубики растительной ткани. Для этого растворы слегка подкрашивают метиленовой синью, внося в маленькие пробирки по небольшой капле красителя. Содержимое пробирок встряхивают. После чего переходят к сравнению плотности каждого опытного раствора с плотностью контрольного.

Результаты записать в таблицу. Направление движения окрашенной струйки показать стрелкой, а соотношение сосущей силы клеток и раствора знаком «>» или «<». Найти раствор, концентрация которого после пребывания в нем растительных тканей не изменилась. Определить осмотическое давление данного раствора и равную ему сосущую силу клеток, используя уравнение Вант-Гоффа.

Концентрация раствора, М	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
Направление движения струйки	↓	↕	↓	↓	↓ ₁	↓ ₁	↑
Соотношение между сосущей силой клетки и раствора	<	<	<	<	<	=	>
Тип раствора	гипер	гипер	гипер	гипер	гипер	изотон	гипер
Сосущая сила клеток, атм	24,2	19,4	14,5	12	9,7	7	4,8

145

Контрольные вопросы к заданию 1.

1. От чего зависит направление движения струйки?

Зависит от плотности раствора. В потоке ~~всегда~~ более торо. 25

2. На каком принципе основан метод струек?

При изменении плотности раствора меняется и его концентрация. 25

3. Для чего при определении сосущей силы клеток используется раствор метиленовой сини?

Для окрашивания раствора, т.к. раствор сам бесцветен. 25

4. Какие растворы называются изотоническими?

Изотонический раствор - осмотическое давление раствора точно так же равно осмотическому давлению клетки. 25

5. Для чего в уравнение Вант-Гоффа вводится изотонический коэффициент?

Задание 2 (20 баллов). Ответьте на следующие вопросы.

1. Как взаимодействие межклеточных и внутриклеточных механизмов регуляции водного обмена в растениях зависит от условий окружающей среды и какие сигнальные пути участвуют в адаптации водного баланса при изменении гидротермических условий?

20 Мертвые точки: * * * * * запускают
сложный процесс вследствие которо-
го происходит закрытие устьиц.

Абсцизовая кислота: нужна для адап-
тации к стрессу как механизм дифферен-
цирования

2. Как взаимодействие процессов анаэробного и аэробного дыхания в растениях регулируется на молекулярном уровне в ответ на гипоксические условия, и какие адаптивные механизмы обеспечивают выживание и рост растений при длительном ограничении кислорода?

25 Это явление аттенуации в корнях,
они нужны для запаса воздуха.
Некоторые растения запасают
ком пост для экономии энергии.

3. Проанализируйте комплексные взаимодействия между различными макро- и микроэлементами в процессе минерального питания растений. Обсудите роль специфических транспортных белков и регуляторных механизмов в обеспечении оптимальной минерализации и предотвращении токсичности элементов.

Макро- и микроэлементы обмениваются между собой.

05

4. Объясните механизмы и физиологические последствия фотодыхания у растений при высоких интенсивностях света и дефиците кислорода. Как фотодыхание влияет на эффективность фотосинтеза, энергетический баланс и рост растений, какие ферменты принимают участие в этом процессе.

Фермент Губкина при высокой температуре он захватывает молекулы O_2 вместо CO_2

25

5. Объясните роль и взаимосвязь между световыми и темными фазами фотосинтеза в контексте их регуляции при различных условиях освещенности и внешних факторов (например, температура, наличие CO_2 , уровень окислительного стресса).

В световой фазе идет выработка энергии, которая нужна для темной

15

Всё гудит.

6. Как изменение условий окружающей среды влияет на эффективность перераспределения энергии и метаболические пути в фотосинтезе? Включите в ответ механизм взаимодействия между фотосистемами, ферментативные регуляторы и адаптационные реакции растений.

15 Регуляторное взаимодействие между фотосистемами и ферментативными регуляторами может менять метаболические пути.

Адаптивное: термия безона-но рассеивается в виде тепла.

7. Объясните механизмы физиологической и молекулярной адаптации растений к различным стрессовым факторам, таким как засуха, высокая или низкая температура, солевой и окислительный стресс. Включите в ответ роль генов, сигнальных путей, активных молекул и структурных изменений.

15 Эти факторы организмов могут иметь метаболизм.

8. Подсчитайте, сколько энергии накапливается в виде АТФ при окислении 1 молекулы глюкозы в процессе клеточного дыхания, если известно, что энергия третьей сложноэфирной фосфатной связи АТФ равняется 41,87 кДж/ моль.

Если не учитывать потери:

$$38 \cdot 41,87 = 1591,06$$

Если учитывать потери:

~~$$32 \cdot 41,87 = 1339,84$$~~

$$32 \cdot 41,87 = 1339,84$$

25

9. Чему равно осмотическое давление клетки при $t = 20^\circ\text{C}$, если известно, что изотонический для данной клетки раствор NaCl имеет концентрацию 0,3 М?

$$0,082 \cdot 293 \cdot 2 \cdot 0,3 = 14,41$$

25

10. Клетка находится в состоянии полного завядания, осмотическое давление клеточного сока равно 6 атм. Чему равна сосущая сила клетки?

Клетка находится в завядании $\rightarrow 0$

$$6 - 0 = 6$$

25

Очный тур Акмуллинской олимпиады по биологии

2025-2026 учебный год

10-11 класс, СПО


Задания очного тура

378

ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ

Перед Вами задания очного тура. Ответы на задания очного тура необходимо прописать на бланках с заданием. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 56.

Задание 1 (31 балл). Рассмотрите рисунок, иллюстрирующий наследование признака «пестрые листья» у растения ночная красавица. Представлены три варианта листьев: зеленый (а), пестрый (b) и белый (с). Три серии экспериментов показывают результаты скрещиваний трех типов родительских особей. Анализируя представленные данные, выполните задания:



1. Какой тип нуклеиновой кислоты определяет формирование данного признака? Укажите локализацию этой нуклеиновой кислоты в клетке. Какой тип наследования при этом наблюдается?

25

Мит; ДНК

Локализация: цитоплазма

Наследование: цитоплазматическое

2. Укажите основные отличия данного типа нуклеиновой кислоты от ядерной (геномной) ДНК?

20
Хлоропластная -
Ядерная - линейная
Хлоропластная имеет петле-
вую форму, соответственно она менее
устойчива.

3. Укажите особенности наблюдаемого типа наследования?

05
Характер наследования идет по материнской
линии.
Результатом является до-
минирование от матери.

4. Какие клеточные процессы контролирует данная нуклеиновая кислота? Почему возникает пестролистность? Возможна ли полная потеря зеленых участков листа?

20
Трофизмы; синтез белков
Трофизмы не синтезируют
хлорофиллы из-за этого происходит
пестролистность.
Да возможна - белые участки они
не синтезируют хлорофиллы.

5. Опишите возможный механизм возникновения данного типа нуклеиновой кислоты в растениях согласно современной теории эволюции? Почему именно этот тип наследования носит исключительно материнский характер?

Числа бактерий почти никак
не размножаются, но не репродуцируются
их.


В зиготу от матери попадают
цитоплазматические наследственные
факторы.

6. Может ли пестролистность передаваться от отца потомству?
Если да, то каким образом? Если нет, почему такое невозможно?

Большинство признаков не
передается от отца потомству,
потому что идет наследова-
ние по материнской линии,
но Т-гены исключение.

Задание 2 (8 баллов). У бактерий синтез аргинина проходит в несколько этапов с образованием промежуточных продуктов, которые являются субстратами для следующего биохимического этапа. Четыре независимо полученных аргининзависимых мутанта вызывают нарушение одного из этапов биохимического пути синтеза аргинина в клетке. Эти мутанты были обозначены как *argE*, *argG*, *argH* и *argI*. Клеточные суспензии мутантов были высеяны штрихами на чашку с агаризованной глюкозо-солевой (минимальной) средой с добавлением ограниченного количества аргинина, достаточного для обеспечения слабого роста клеток *arg*-мутантов. Штрихи расположены на среде в виде четырехугольника таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. На некоторых концах штрихов отмечен обильный рост (зачернен на рисунке).

Объясните природу обильного роста клеток. Зачем необходимо добавлять ограниченное количество аргинина в питательную среду? В каком порядке в пути биосинтеза аргинина расположены энзиматические этапы, блокированные мутациями *argE*, *argG*, *argH* и *argI*?



Мутанты обильно растут по
 принципу: ~~кто~~ Кто стоит позже
 в цепи короче того, кто стоит
 раньше.

Аргинин нужен для запуска
 роста

Последовательность: $Arg E \rightarrow Arg I \rightarrow Arg G \rightarrow Arg H$.

Түрлері:

~~N - Кошулма~~

D - CRR5del32

M - (CRR5M30)

Dm - (CRR5del32 + CRR5M30)

1. MIM генотипі.

2. Dm/Dm генотипі

3. M/Dm генотипі

4. D/Dm генотипі

5. N/Dm не генотипі

6. M/D генотипі

7. M/D генотипі.

8. N/M не генотипі

9. D/D генотипі

10. N/D не генотипі

11. N/N не генотипі.

175