

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Башкирский государственный
педагогический университет им. М.Акумлы

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

АКМУЛЛИНСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПО БИОЛОГИИ

Участник Кудашева Нешиа Азаматовна

(фамилия имя отчество)

ФИО наставника Калимова Минириса Хамидовича
В.И.

Дата проведения олимпиады
«05» марта 2025 г.

Шифр 11-20

$$\Sigma 25 + 3 = 28$$

Заключительный этап Акмуллинской олимпиады по биологии

2024-2025 учебный год

10-11 класс, СПО

255

БИОХИМИЯ

Перед Вами задания кабинета «Биохимия» Заключительного этапа Акмуллинской олимпиады по биологии. Ответы на задания практического тура необходимо прописать на бланках с заданием. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 26.

Задание 1 Вам необходимо выбрать только один ответ, который Вы считаете наиболее полным и правильным. Индексы правильных ответов внесите в таблицу ответов.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
а	+	+			+		+		+	
б			+					+		○
в				+	+	+	○	○		+
г										
№	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
а			○		+			+	○	+
б	+	-	+	+			+	○		
в									+	
г		+				+				

138

1. Определите основную функцию глутатиона в клетках организма:

- а) Антиоксидантная защита
- б) Синтез белков
- в) Транспорт ионов
- г) Хранение энергии

2. Почему гуанозинтрифосфат (GTP) часто называют энергетической валютой клеток?

- а) Он используется в качестве источника энергии для различных процессов в клетке
- б) Он регулирует активность многих ферментов
- в) Он служит предшественником для синтеза ДНК
- г) Он участвует в передаче нервных импульсов

Шифр 11-20

3. Что представляет собой ферментативная кинетика Михаэлиса-Ментена?
- а) Закон сохранения массы
 - б) Модель скорости химической реакции, зависящей от концентрации субстрата
 - в) Теория термодинамического равновесия
 - г) Принцип работы каталитического цикла
4. Где происходит бета-окисление жирных кислот в эукариотических клетках?
- а) Цитоплазма
 - б) Ядро
 - в) Митохондрия
 - г) Эндоплазматический ретикулум
5. Какой тип фермента катализирует гидролиз эфирных связей между жирными кислотами и глицерином?
- а) Гидролазы
 - б) Оксигеназы
 - в) Декарбоксилазы
 - г) Изомеразы
6. В каком процессе происходит образование АТФ путем окисления NADH и FADH₂?
- а) Гликолизе
 - б) Цикле Кребса
 - в) Окислительном фосфорилировании
 - г) Фотопериодизме
7. Какие белки отвечают за транспорт ионов через клеточные мембраны?
- а) Каналоформеры
 - б) Ферменты
 - в) Транспортёры
 - г) Рецепторы
8. Сколько карбоксильных групп содержится в молекуле лимонной кислоты?
- а) Одна
 - б) Две
 - в) Три
 - г) Четыре
9. Какой класс ферментов катализирует перенос функциональных групп от одной молекулы к другой?
- а) Трансферазы
 - б) Лиазы
 - в) Гидролазы
 - г) Лигазы
10. Основное отличие насыщенных жиров от ненасыщенных состоит в...
- а) Количестве атомов водорода, присоединённых к углеродному скелету
 - б) Числе двойных связей в углеводородной цепи

в) Температуре плавления

г) Способности растворяться в воде

11. Что такое аллостерическая регуляция ферментов?

а) Изменение активности фермента путём прямого связывания с субстратом

б) Изменение активности фермента путём связывания с регуляторной молекулой вне активного центра

в) Механизм, позволяющий ферменту работать быстрее при высоких температурах

г) Процесс разрушения фермента после завершения реакции

12. Назовите процесс, при котором происходит превращение пировиноградной кислоты в ацетил-КоА перед входом в цикл Кребса:

а) Гликолиз

б) Карбоксилирование

в) Пирофосфоролиз

г) Декарбонилирование

13. Какое соединение является универсальным донором метильной группы в реакциях трансметилирования?

а) S-Аденозилметионин (SAM)

б) Метанол

в) Формальдегид

г) Холин

14. Какие ферменты участвуют в репарации повреждений ДНК?

а) Топоизомеразы

б) ДНК-полимеразы

в) РНК-полимеразы

г) ДНК-метилтрансферазы

15. В чём состоит роль НАД⁺ в метаболических процессах?

а) Он действует как донор электронов в окислительно-восстановительных реакциях

б) Участвует в синтезе жирных кислот

в) Необходим для активации ферментов

г) Служит источником энергии для мышечных сокращений

16. Почему некоторые ферменты требуют наличия кофакторов для своей активности?

а) Они увеличивают стабильность фермента

б) Они необходимы для связывания субстрата

в) Они обеспечивают необходимую конформацию активного центра

г) Они участвуют в переносе электронов или функциональных групп

17. Оксалоацетат — это промежуточный продукт какого важного метаболического пути?

а) Гликолиза

б) Цикла Кребса

в) Пентозофосфатного пути

г) Кальвинского цикла

Шифр _____

18. Какое вещество является ключевым медиатором воспаления?

- а) Интерлейкин-1
- б) Простагландины
- в) Гистамин
- г) Серотонин

19. Какое соединение является главным переносчиком электронов в дыхательной цепи митохондрий?

- а) Коэнзим Q
- б) Цитохром C
- в) NADH
- г) FADH₂

20. Порфириновые кольца входят в состав какого важнейшего компонента крови?

- а) Гемоглобина
- б) Фибриногена
- в) Альбумина
- г) Иммуноглобулинов

Задание 2 (16 баллов).

125.

Реактивы: свежий 3%-ный раствор пероксида водорода, ткани растений (кусочки сырого и варёного картофеля).

Оборудование: пробирки, пинцет, песок, ступка и пестик.


Ход работы:

1. Приготовьте две пробирки со свежим 3%-ным раствором пероксида водорода, затем поместите в первую пробирку кусочек сырого картофеля, во вторую – кусочек варёного картофеля. Пронаблюдайте, что будет происходить в каждой пробирке. Данные наблюдения и выводы запишите в таблицу.
2. Измельчите в ступке кусочек сырого картофеля с небольшим количеством песка. Перенесите измельчённый картофель вместе с песком в пробирку и капните туда немного пероксида водорода. Сравните активность измельчённой и целой растительной ткани. Данные наблюдения и выводы запишите в таблицу.

Что делали?	Что наблюдали?	Выводы
1. В пробирку с раствором H ₂ O ₂ положили кусочек сырого картофеля	Ничего не произошло ничего не произошло произошло выделение газа 2.5	H ₂ O ₂ прореагировал расщепился ферментами, содержащимися в сыром картофеле, в ходе которого происходит выделение O ₂ . В сыром картофеле содержатся ферменты, которые не денатурировались 2.5

<p>2. В пробирку с раствором H₂O₂ положили кусочек варёного картофеля.</p>	<p>Произошло выделение ничего, никаких признаков изменений не произошло</p> <p style="text-align: right;">25</p>	<p>В варёном картофеле произошла обратная реакция денатурация ферментов под действием высокой температурой. Соответственно, реакция не произошла и не расщепилась</p> <p style="text-align: right;">25</p>
<p>3. В пробирку с раствором H₂O₂ положили кусочек измельчённого сырого картофеля.</p>	<p>Произошло обильное выделение кислорода</p> <p style="text-align: right;">25</p>	<p>Так, получилось активное расщепление перекиси под действием ферментов картофеля</p> <p style="text-align: right;">25</p>

Напишите уравнение реакции, которую катализирует фермент, ускоряющий расщепление H₂O₂:



К какому классу относится фермент? Какие типы реакций катализирует?

к классу гидролаз

Заключительный этап Акмуллинской олимпиады по биологии

2024-2025 учебный год

10-11 класс, СПО

38

ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ


Перед Вами задания кабинета «Генетика и эволюция» Заклучительного этапа Акмуллинской олимпиады по биологии. Ответы на задания практического тура необходимо прописать на бланках с заданием. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 23,5.

Задание 1. Вам необходимо отметить верные и неверные утверждения. Индексы правильных ответов внесите в таблицу ответов (макс. 12,5 баллов).

№	1		2		3		4		5	
	В	Н	В	Н	В	Н	В	Н	В	Н
а	+	○		⊗	○		+	○	⊗	
б		○	+	○		○	○		○	+
в	○		○	⊗	○	+		⊗	○	
г		⊗	○		⊗	○		○	○	
д		○		○	+	⊗	○			○

2

1. На фотографии представлен череп животного X, обитавшего на территории Австралии с позднего плиоцена, вплоть до появления на континенте первых людей.



Шифр _____

Известно, что у этого животного плечо было короче предплечья, но бедро — длиннее голени. Какие выводы можно сделать на основании представленных данных?

- а) вид X принадлежал к отряду Хищные;
- б) вид X во взрослом состоянии имел 24 зуба;
- в) резцы вида X выполняли функцию клыков;
- г) вид X был специализирован к быстрому бегу;
- д) основная функция наиболее крупных зубов в зубной системе вида X — разжёвывание и растирание куска пищи.


2. В истории формирования биосферы Земли палеозойская эра, продолжавшаяся 300 млн. лет, имеет важное значение, поскольку в ней произошли следующие эволюционные события:

- а) появление динозавров;
- б) появление покрытосеменных растений;
- в) выход растений и животных из воды на сушу;
- г) появление животных с твердым наружным или внутренним скелетом;
- д) возникновение многоклеточных организмов.

3. В результате «великого вымирания» на рубеже между пермским и триасовым периодами 250 млн. лет назад исчезло более 90 % водных и более 70% наземных видов животных, среди которых:

- а) трилобиты;
- б) аммониты;
- в) ракоскорпионы;
- г) панцирные рыбы;
- д) стегоцефалы.

4. На рисунке представлена родословная некоторой семьи,отягощенная редким наследственным заболеванием. Кругами обозначены женщины, квадратами — мужчины. Больные индивиды выделены черным цветом. Изучите рисунок, после чего оцените истинность суждений.



- а) За развитие заболевания возможно отвечает один ген, представленный двумя аллелями. Дефектная аллель рецессивна.

- б) За развитие заболевания возможно отвечают два гена, взаимодействующие по принципу комплементарности.
- в) За развитие заболевания возможно отвечает ген, расположенный в митохондриальной ДНК.
- г) За развитие заболевания возможно отвечает ген, расположенный в X-хромосоме.
- д) Вероятность рождения здорового ребенка в браке двоюродных брата и сестры скорее всего равняется 50%.

5. Выберите расщепление по фенотипу, которое может произойти в потомстве от скрещивания особей $AaBb \times Aabb$ в зависимости от типа взаимодействия генов А и В:

- а) 3 : 3 : 1 : 1 при полном доминировании по обоим генам;
- б) 4 : 3 : 1 при рецессивном эпистазе b над A ;
- в) 6 : 1 : 1 при доминантном эпистазе A над B ;
- г) 3 : 3 : 2 при рецессивном эпистазе A над b ;
- д) 6 : 1 : 1 при доминантном эпистазе B над A .

Задание 2. Перед Вами задания с открытым вариантом ответа. Ответы на задания необходимо прописать на бланках с заданием (макс. 11 баллов).

Ген группы крови по системе АВО расположен в длинном плече 9 хромосомы (9q34). У гена группы крови АВО есть минимум 3 аллели: I^A , I^B , i (I^O). В табл.1 представлена геногеография по системе АВО.

Таблица 1

Геногеография по системе АВО

Группа крови	Распространённость
0(I)	Новый свет (Южная и северная Америки)
A(II)	Европа и Австралия
B(III)	Азия
AB(IV)	5% всего населения

Ответьте на следующие вопросы:

1. Какой эволюционный фактор обуславливает низкую частоту встречаемости аллеля I^B в коренных южноамериканских популяциях?

2. Какой континент люди заселили ранее — Северную или Южную Америку?

3. Какая группа крови преобладает в южноамериканской популяции, если частота аллеля I^B там ниже 5%?

Шифр _____

